

ជំងឺប៉េស្តូជ្រូកអាហ្វ្រិក

កុំអនុញ្ញាតឲ្យជ្រូកអ្នកងាប់ដោយជំងឺប៉េស្តូជ្រូកអាហ្វ្រិក

អនុវត្តវិធានជីវៈសុវត្ថិភាពងាយៗកុំឲ្យជំងឺប៉េស្តូជ្រូកអាហ្វ្រិកចូលក្នុងកសិដ្ឋានអ្នក

១. ការធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន

ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងរាល់ពេលទៅមើលជ្រូក

ត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតនិងសាប៊ូ

ត្រូវម្ខាបមេរោគស្បែកជើងរាល់ពេលចូលទ្រុងជ្រូក

២. ការរក្សាកសិដ្ឋាន និងទ្រុងស្អាត និងមានអនាម័យ

ត្រូវបោសសម្អាតកសិដ្ឋាន និងទ្រុងឲ្យបានទៀងទាត់

ត្រូវលាងសម្អាតទះ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗនិងប្រើវាតែជាមួយជ្រូកប៉ុណ្ណោះ

ត្រូវម្ខាបមេរោគក្នុងកសិដ្ឋានដោយម្ខាបមេរោគ ឬក៏បោស

៣. ការផ្តល់ចំណី

មិនគួរឲ្យជ្រូកស៊ីកាកសំណល់ផ្ទះបាយនោះទេ

បើឲ្យកាកសំណល់ផ្ទះបាយត្រូវដាំឲ្យពុះ ១០០ អង្សាសេ រយៈពេល ៣០នាទីមុនឲ្យទៅជ្រូកស៊ី

មិនត្រូវយកទឹកដែលលាងសាប្បុចធ្វើជាចំណីសម្រាប់ជ្រូកនោះទេ

៤. ការចូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ឲ្យតែយានជំនិះនិងមនុស្សដែលមានការអនុញ្ញាតចូលក្នុងកសិដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ

មិនត្រូវឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលកសិដ្ឋានក្រៅពីបុគ្គលិកថែទាំជ្រូក

៥. ធ្វើឲ្យហ្មឺងសត្វទាំងមូលមមានសុខភាពល្អ

ធ្វើទ្រុង ឬបងការពារកុំឲ្យប៉ះនិងជ្រូកដទៃ ហើយគួរធ្វើបងពីរជាន់

ដាក់ជ្រូកថ្មីដាច់ដោយឡែកពីជ្រូកចាស់យ៉ាងហោច ៣០ថ្ងៃ

មេជ្រូករបស់អ្នកត្រូវបង្កាត់ជាមួយតែបាជ្រូកដែលមានសុខភាពល្អ

