


โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

อย่าให้โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำลายสุกรของท่าน

ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพพื้นฐาน เพื่อป้องกันโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

1. สุขอนามัยของผู้เลี้ยง



เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนปฏิบัติงานในฟาร์ม



ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด



ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรองเท้าทุกครั้ง ทั้งเข้าและออก ก่อนสัมผัสสุกรในแต่ละเล้า

2. ฟาร์มและเล้าสุกร



ทำความสะอาดฟาร์มและเล้าสุกรสม่ำเสมอ



ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในฟาร์ม และอย่าใช้ปนกับฟาร์มอื่น



ทำการฆ่าเชื้อภายในฟาร์มโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อ หรือใช้ปูนขาวอย่างสม่ำเสมอ

3. อาหารสุกร



หลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารเหลือเลี้ยงสุกร



หากมีความจำเป็นต้องใช้เศษอาหาร ให้ทำการต้ม ให้เดือดเป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่จะนำไปให้สุกร



ใช้น้ำสะอาดเลี้ยงสุกร อย่าใช้น้ำล้างเนื้อ ในการเลี้ยงสุกร

4. การเข้าออกฟาร์ม

อนุญาตเฉพาะยานพาหนะ และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าฟาร์ม

ห้ามไม่ให้คนภายนอก เข้าเล้าสุกร ให้เฉพาะ คนงานในเล้าเท่านั้น

5. พู่งสัตว์ปลอดโรค

สร้างรั้วหรือเล้าให้เหมาะสม แนะนำให้มีรั้วสองชั้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้สุกรสัมผัส สุกรอื่นภายนอกฟาร์ม

กักสุกรที่นำเข้ามาใหม่ โดยให้แยกออกจากสุกรเดิม เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

แม่หมูควรได้รับการผสมจากสุกรที่ ปลอดโรค แข็งแรง เชื่อถือได้เท่านั้น