




# โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

## อย่าให้โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำลายสุกรของท่าน

ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพพื้นฐาน เพื่อป้องกันโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

### 1. สุขอนามัยของผู้เลี้ยง



เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนปฏิบัติงานในฟาร์ม



ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด



ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรองเท้าทุกครั้ง ทั้งเข้าและออก ก่อนสัมผัสสุกรในแต่ละเล้า

### 2. ฟาร์มและเล้าสุกร



ทำความสะอาดฟาร์มและเล้าสุกรสม่ำเสมอ



ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในฟาร์ม และอย่าใช้ปนกับฟาร์มอื่น



ทำการฆ่าเชื้อภายในฟาร์มโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อ หรือใช้ปูนขาวอย่างสม่ำเสมอ

### 3. อาหารสุกร



หลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารเหลือเลี้ยงสุกร



ควรใช้อาหารสุกรสำเร็จที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยงสุกร



ใช้น้ำสะอาดเลี้ยงสุกร อย่าใช้น้ำล้างเนื้อ ในการเลี้ยงสุกร

### 4. การเข้าออกฟาร์ม

อนุญาตเฉพาะยานพาหนะ และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าฟาร์ม

ห้ามไม่ให้คนภายนอก เข้าเล้าสุกร ให้เฉพาะ คนงานในเล้าเท่านั้น

### 5. พู่งสัตว์ปลอดโรค

สร้างรั้วหรือเล้าให้เหมาะสม แนะนำให้มีรั้วสองชั้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้สุกรสัมผัส สุกรอื่นภายนอกฟาร์ม

กักสุกรที่นำเข้ามาใหม่ โดยให้แยกออกจากสุกรเดิม เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

แม่หมูควรได้รับการผสมจากสุกรที่ ปลอดโรค แข็งแรง เชื่อถือได้เท่านั้น