



DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI (DTLCP)

Đừng để lợn của bạn chết vì dịch tả lợn Châu Phi!

Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học cơ bản sau để ngăn DTLCP xâm nhập vào trang trại của bạn:

1. Vệ sinh cá nhân



Luôn thay quần áo và giày / dép trước khi chăm sóc lợn



Rửa tay thật sạch bằng xà phòng



Khử trùng ủng ở mỗi lối vào chuồng

2. Duy trì trại / chuồng nuôi sạch sẽ và gọn gàng



Vệ sinh chuồng trại thường xuyên



Làm sạch dụng cụ và chỉ sử dụng chúng cho lợn của bạn



Thường xuyên khử trùng trại bằng thuốc khử trùng hoặc vôi bột


3. Thức ăn



Không nên cho lợn ăn thức ăn thừa



Lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất là cho lợn ăn thức ăn công nghiệp



Không sử dụng lại nước bạn đã rửa thịt lợn để nấu thức ăn

4. Vào trại

Chỉ các phương tiện và nhân viên được cho phép mới được vào trại

Không cho bất kỳ ai vào chuồng lợn trừ người chăm sóc lợn

5. Duy trì đàn lợn khỏe mạnh

Xây chuồng / hàng rào để tránh lợn tiếp xúc với những con lợn khác. Khuyến khích xây hàng rào đôi

Nuôi tách riêng những con mới nhập về với lợn đang nuôi ít nhất 30 ngày

Lợn nái của bạn chỉ nên giao phối với những con lợn đực được xác định khỏe mạnh

